

616.5-085

NAŠE ZKUŠENOSTI S LOKÁLNÍ APLIKACÍ SKIN-CAP SPREJE

Dílčí otevřená studie

Plk. MUDr. Zdeněk KALOŠ
Dermatovenerologické oddělení Ústřední vojenské nemocnice, Praha
(náčelník: plk. MUDr. Zdeněk Kaloš)

Úvod

Od října 1992 probíhá na našem pracovišti zkoušení lokálního externa SKIN-CAP ve formě spreje od španělské firmy Laboratorios Cheminova Internacional, S. A.

Preparát obsahuje v každém ml aerosolového roztoku 5 mg piritionátu zinku a 1 mg metyletylsulfátu sodíku. Jde o látku bezbarvou, bez vůně i zápachu. Při aplikaci je bez rušivých momentů jak pro pacienty, tak pro obsluhující personál.

Metodika

Přípravek jsme zatím použili u 130 pacientů léčených ambulantně i za hospitalizace na dermatovenerologickém oddělení Ústřední vojenské nemocnice Praha u 3 zcela rozličných dermatóz, konkrétně psoriázy, dermatitis atopica a dermatitis seborrhoica. Sprej byl aplikován 2x denně na sledovaná místa po dobu 2 týdnů.

Při hodnocení účinku léčby jsme posuzovali jednak klinické změny projevů, tedy ústup zarudnutí, šupinatění, infiltrace ložisek a mastnost kůže, jednak subjektivní pocity svědění. Léčebný efekt preparátu jsme hodnotili jako odhojen, výrazně zlepšen, mírně zlepšen, léčba bez efektu a zhoršen.

Na plochy ošetřované preparátem SKIN-CAP nebyla po dobu aplikace použita jiná zevní terapie. Z celkových léků

nebyla podávána žádná antihistaminika, aby nedošlo k ovlivnění pocitu svědění u nemocných. Do sestavy nebyli zařazeni nemocní s celkovou kortikosteroidní terapií.

Výsledky a diskuse

Ve skupině 63 pacientů s psoriázou byl přípravek použit převážně u chronicko-stacionární formy onemocnění (48), dále u 13 pacientů s akutně exantematickou formou a u 2 pacientů s psoriatickou erythrodermií. K výraznému zlepšení došlo především u psoriatické erythrodermie a akutně exantematické formy psoriázy. U chronicko-stacionární formy byl preparát aplikován po předchozí keratolytické léčbě salicylovou vazelinou nebo olejem. V této skupině bylo nejvíce pacientů hodnoceno stupněm zlepšen. Ze skupiny psoriatiků byli po léčbě 3 pacienti odhojeni, 22 výrazně zlepšeno, 36 mírně zlepšeno, u 2 pacientů byla léčba bez efektu. Ani u jednoho pacienta jsme nezaznamenali zhoršení projevů.

Ve skupině 48 pacientů s atopickou dermatitidou byl výrazný efekt léčby u 3 nemocných s diseminací projevů s přechodem do erythrodermie. Ostatní pacienti v této skupině měli převážně flexurální formu onemocnění. Léčebný efekt byl i zde hodnocen velice příznivě. U 5 pacientů došlo k úplnému odeznění kožních projevů, 33 bylo výrazně zlepšeno a 10 mírně zlepšeno.

Třetí skupina léčených zahrnuje 19 pacientů se

seborrhoickou dermatitidou. Terapeutické výsledky byly rovněž velice příznivé. Dva pacienti byli zcela odhojeni, 9 výrazně zlepšeno a 8 mírně zlepšeno.

Z výše uvedeného vyplývá, že ze 130 nemocných léčených preparátem SKIN-CAP sprej bylo 10 úplně odhojeno, 64 výrazně zlepšeno a 54 mírně zlepšeno. U 2 pacientů byla léčba bez efektu, ani u jednoho nemocného nedošlo vlivem léčby ke zhoršení kožních projevů. Celkově je možno konstatovat, že u více než 98 % všech léčených pacientů došlo ke kladnému ovlivnění hojení.

Prakticky všichni pacienti terapii subjektivně velmi dobře snášeli, jen 2 nemocní ve skupině atopické dermatitidy si první den aplikace stěžovali na mírné pálení ošetřovaných ploch, shodou okolností u obou v lokalizaci na krku. Subjektivní pocity pálení druhý den ustoupily, takže jsme dále pokračovali v léčení. Alergické projevy jsme nepozorovali u žádného z pacientů. Rovněž u ošetřujícího personálu nedošlo k podráždění kůže, sliznic a spojivkového vaku.

Vzhledem k malému časovému prostoru jsme nemohli stanovit dobu, za kterou by eventuálně došlo po ukončení léčby k opětovnému oživení projevů.

SKIN-CAP sprej je zatím zařazen do kosmetických přípravků. V současné době firma jedná o přeregistraci do skupiny léčiv s možností hrazení pojišťovnou.

Závěr

Tuto studii považujeme za krátké sdělení o novém nekortikoidním externu, které by mohlo, vzhledem k našim výsledkům, výrazně obohatit léčebnou škálu u výše uvedených dermatóz.

Souhrn

V článku jsou shrnuty výsledky klinického zkoušení lokálního zinkového preparátu SKIN-CAP sprej španělské firmy Laboratorios Cheminova Internacional, S. A. u 130 pacientů s psoriázou, atopickou a seborrhoickou dermatitidou. U více než 98 % nemocných došlo k pozitivnímu ovlivnění kožních projevů.

Literatura

1. STOUGHTON R. B.: On psoriasis. New York, Yorke Medical Books 1977. 480 s.

Klíčová slova: SKIN-CAP sprej; Klinické zkoušení.

Do redakce došlo 18. 8. 1993