

KONFERENČNÍ ABSTRAKT

MUDr. Ondřej Rada

SPONTÁNNÍ RUPTURA MOČOVÉHO MĚCHÝŘE PŘI PROTRAHOVANÉ CYSTITIDĚ

Ondřej Rada

Agentura vojenského zdravotnictví AČR
Nemocnice Nymburk s.r.o.

Spontánní ruptura močového měchýře je poměrně vzácné onemocnění a je publikováno velmi málo případů. Za standardní situace se setkáváme spíše s rupturou močového měchýře traumatické etiologie, popřípadě jako komplikace lékařského vyšetření nebo zákroku. Jednou z nejhorších komplikací spontánní ruptury je urinozní peritonitida, která bývá způsobena rupturou ve vrcholu močového měchýře. Jedná se o velmi závažné život ohrožující onemocnění, které v nemalé míře může vést až k septickému šoku a následně smrti. V této kazuistice prezentujeme vzácný případ spontánní ruptury močového měchýře, která byla diagnostikována a léčena na chirurgickém pracovišti okresního typu.

Klíčová slova: Spontánní ruptura močového měchýře; urinozní peritonitida; anurie; protrahovaný uroinfekt.

Zdroje

1. Spontánní ruptura močového měchýře: dva případy z našeho pracoviště. Autoři: J. Pírek; Vyšlo v časopise: Česká urologie, roč. 2017; 21 (1): s. 80-84
2. Haddad, F S, and T L Wachtel. "Spontaneous intraperitoneal rupture of the bladder." Urologia internationalis vol. 42,6 (1987): 467-9.
3. Evans, R A et al. "Idiopathic rupture of the bladder." The Journal of urology vol. 116,5 (1976): 565-7.
4. Mardani, Masoud et al. "Spontaneous perforation of urinary bladder secondary to Candida cystitis: acute abdomen of urologic origin." Surgical infections vol. 9,5 (2008): 525-7.
5. Parker, Hilary et al. "Spontaneous bladder rupture in association with alcoholic binge: a case report and review of the literature." The Journal of emergency medicine vol. 37,4 (2009): 386-9.